



(北斗市YES!cleanレタス)

令和6年3月1日発行

グリーンタイム

渡島農業改良普及センター

TEL 0138-77-8242(代表) FAX 0138-77-8187

定植後の低温に注意して！

今後の気象予報について



3月2日～3日にかけて平年よりも寒くなり、その後も最低気温が平年よりも低くなる予報です。夜温を5℃以上確保するためにトンネルや不織布をかける等の対策を行い、レタスが凍害を受けないように対策をしてください。

定植直後に夜温が0℃以下となった場合、凍害による活着不良が発生し、一時的にしおれる場合があります。

しおれると、外葉が傷み、「すそ枯病」の発生原因となる恐れがあるため、しおれた場合は早期の防除を実施してください。



写真: すそ枯病

【すそ枯病の防除薬剤例】

薬剤名	成分名	分類コード	希釈倍数又は10a使用薬量	使用時期	使用回数	使用方法	成分ポイント
アフエットフロアブル	ペンチオピラド	7	2,000倍 /100~300L	前日	3回以内	散布	1
バリダシン液剤5	バリダマイシン	U18	800倍 /100~300L	前日	3回以内	散布	0
モンカットフロアブル40	フルトラニル	7	1,000~2,000倍 /100~300L	7日前	3回以内	散布	1

※RACコードが同一の薬剤は、連用を避ける。

農薬の使用方法は容器のラベルをよく確認してください